

# PLASTILLA

## DEL DÍA DESPUÉS



### Days

Comprimidos 1,5 mg

Composición y presentación:

Cada comprimido contiene:

Levonorgestrel 1,5 mg

**Excipientes:** Celulosa microcristalina, Lactosa monohidrato, Croscarmelosa sódica, Poloxámero, Estearato de magnesio.

**Indicaciones de uso:** Days comprimidos es un anticonceptivo de emergencia que puede usarse dentro de las 72 horas siguiente (3 días) a haber mantenido relaciones sexuales sin protección o si tu anticonceptivo usual a ha fallado.

**Clasificación:** Anticonceptivo hormonal de emergencia.

**Precauciones y advertencias:** No tome Days Comprimidos si es alérgico a Levonorgestrel o a alguno de los demás componentes de este medicamento.

- Si padece de enfermedad grave al hígado.
- Si se encuentra en cualquiera de las siguientes situaciones, consulte con su médico antes de tomar Days Comprimidos ya que la anticoncepción de emergencia puede no ser adecuada para usted. Su Medico puede prescribirle otro tipo de anticoncepción de emergencia.
- Si está embarazada o cree estarlo, este medicamento no funcionara. Si ya lo está, Days Comprimidos no puede interrumpir el embarazo, por lo que Days Comprimidos no es una “píldora abortiva”.
- Si su periodo tiene mas de 5 días de retraso o ha experimentado un sangrado inusual cuando le toca su próximo periodo.
- Si ha mantenido relaciones sexuales sin protección hace mas de 72 horas y desde su último periodo.

**Niños y adolescentes:** Days Comprimidos no está indicado para el uso antes del primer sangrado menstrual.

**Embarazo:** No debe tomar este medicamento si ya está embarazada. Si queda embarazada, incluso después de tomar este medicamento, es importante que acuda a su médico/matrona.

**Lactancia:** El ingrediente activo de este medicamento es excretado en la leche materna, se sugiere que tome el comprimido inmediatamente después de la lactancia y evitar amamantar al menos 8 horas después de la administración de Levonorgestrel. Luego drene la leche con un extractor de leche durante las 8 horas posteriores a la ingesta del comprimido. De esta forma está tomando su comprimido mucho antes de la siguiente lactancia y reduciendo la cantidad de ingrediente activo que su bebé puede estar ingiriendo con la leche materna.

**Fertilidad:** Days Comprimidos aumenta la posibilidad de tener alteraciones en la menstruación, que a veces, puede llevar a una fecha de ovulación temprana o tardía, lo que da como resultado una fecha de fertilidad modificada.

**Contraindicaciones:** El uso de Days Comprimidos no está recomendado si padece una enfermedad del intestino delgado (como la enfermedad de Crohn) que inhibe la absorción del medicamento, si tiene problemas hepáticos graves, si tiene antecedentes de embarazo ectópico (cuando el bebé se desarrolla en algún lugar fuera del útero) o si tiene antecedentes de salpingitis (inflamación de las trompas de Falopio).

## **Interacciones:**

### **No debe administrarse conjuntamente con**

- Barbitúricos y otros medicamentos usados para el tratamiento de la epilepsia (por ejemplo, primidona, fenitoína y carbamazepina)
- Medicamentos usados para el tratamiento de la tuberculosis (por ejemplo, rifampicina y rifabutina)
- Medicamentos para el tratamiento del VIH (ritonavir, efavirenz)
- Medicamentos usados para el tratamiento de infecciones fúngicas (griseofulvina)
  
- Medicamentos herbarios que contengan la Hierba de San Juan (*Hypericum Perforatum*)

**Reacciones adversas:** No se alarme por la lista de posibles reacciones adversas, ya que aquellas de carácter más grave sólo se producen en raras ocasiones. Si Ud. presenta alguna de las siguientes reacciones adversas mientras esté en tratamiento con este medicamento, acuda a un médico tan pronto como sea posible:

- **Incidencia más frecuentes:** Náuseas, sangrado irregular hasta el próximo periodo, dolor abdominal, cansancio, dolor de cabeza.
- **Incidencia frecuente:** Vómitos, cambio en el periodo, senos sensibles, diarrea, mareos.
- **Incidencia rara:** Rash, urticaria, prurito, hinchazón de la cara, dolor pélvico, periodo doloroso.

Consulte a su médico/matrona si ocurre cualquier efecto adverso, aunque no haya sido mencionado anteriormente.

**Dosis y modo de uso:** 1 comprimido de Days de 1.5 mg en una sola dosis, preferiblemente dentro de las 12 horas y no después de las 72 horas (3 días) posteriores a la relación sexual no protegida.

**Modo de empleo:** Los comprimidos se administran por vía oral, con un vaso de agua.

**Sobredosis:** Síntomas de sobredosis aguda: náuseas, vómitos, hemorragia vaginal (por privación). En caso de sobredosis, acudir a un centro asistencial y llevar este folleto.

**Condiciones de almacenamiento:** Mantener fuera del alcance de los niños, en su envase original, protegido del calor, la luz y la humedad. No use este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.